

癌化学療法名 膀胱癌 M-VAC療法

実施部署	入院	1クール日数	28day	承認済 2008.3.26
番号	抗がん剤名・略称	1日投与量	投与方法	投与日
1	メトトレキサート(MTX): メトトレキサート	30mg/m ²	点滴静脈注射	day1
2	ビンブラスチン(VBL): エグザール	3mg/m ²	点滴静脈注射	day2
3	ドキシソビシン(DXR): アドリアシン	30mg/m ²	点滴静脈注射	day2
4	シスプラチン(CDDP): プリプラチン	70mg/m ²	点滴静脈注射	day2
コメント	・メトトレキサートの腎障害防止のため、十分な尿量確保と尿のアルカリ化のためメイロンとダイアモックスを投与			

投与日	薬剤名	ルート	時間
day1	① 生食1,000mL + KCL20mEq + メイロン40mL	点滴静注	84mL/H
	② 生食1,000mL + 50%ブドウ糖40mL + アスパラカリウム10mEq + メイロン40mL	点滴静注	84mL/H
	③ ダイアモックス注500mg + 生食 20mL	側管	ゆっくり
	④ メトトレキサート30mg/m² + 生食 100mL	点滴静注	1時間
	⑤ ソルアセトD 500mL	点滴静注	6時間
	⑥ ソルアセトD 500mL	点滴静注	6時間
day2	① 生食1,000mL + KCL20mEq + 硫酸Mg1mEq	点滴静注	3時間
	② 生食50mL	点滴静注	300mL/H
	③ プロイメンド注 + デキサート注6.6mg + 生食100mL	点滴静注	30分
	④ 生食50mL	点滴静注	300mL/H
	⑤ アロキシ注 + 生食100mL	点滴静注	30分
	⑤ エグザール3mg/m² + 生食100mL	点滴静注	30分
	⑥ アドリアシン30mg/m² + 生食20mL	点滴静注	30分
	⑦ マンニトール注 150mL	点滴静注	30分
⑧ プリプラチン70mg/m² + 生食500mL	点滴静注	2時間	

投与日	薬剤名	ルート	時間
day3	① ソルアセトD 500mL	点滴静注	84mL/H
	② ソルアセトD 500mL	点滴静注	84mL/H