

癌化学療法名 脳腫瘍(再発) ベパシズマブ(10)単独療法

実施部署	入院・外来	1クール日数	14day	承認済 2013.7月
番号	抗がん剤名・略称	1日投与量	投与方法	投与日
1	ベパシズマブ: アバスチン	10mg/kg	div.(点滴静注)	day1,8,15~(2週間ごと)
2				
3				
4				
5				
コメント	<ul style="list-style-type: none"> ・アバスチンは、平成23年6月に「悪性神経膠腫」の適応追加になりました。 ・アバスチンのinfusion reaction を軽減させるために、初回は90分かけて点滴静注し、認容性がある場合は2回目以降は60分⇒30分に短縮できる。 ・アバスチンの溶解液は生食を使用する。ブドウ糖を混合した場合はアバスチンの力価減弱する恐れがある。 ・再発悪性神経膠腫を対象とした臨床試験では、アバスチンは病態進行又は許容できない有害事象の発現まで投与した。 ・アバスチンは、最少度(催吐性)リスクに分類されるため、通常は予防的な制吐療法は推奨しない。 (・初発悪性神経膠腫の場合、アバスチンは放射線照射及びテモゾロミドとの併用により開始する。) 			

投与日	薬剤名	ルート	時間
day1	① 生食50mL ② アバスチン10mg/kg + 生食100mL ③ 生食20mL	div. div. div.	15分 90分 フラッシュ