

癌化学療法名 大腸癌 ベバシズマブ(5)+S-1療法

実施部署	入院・外来	1クール日数	42day	承認
番号	抗がん剤名・略称	1日投与量	投与方法	投与日
1	ベバシズマブ:アバスチン	5mg/kg	div.(点滴静注)又はIVH	day1,15,29
2	S-1		1日2回朝夕食後 14日間内服 7日間休薬	day1~28内服、 day29~42休薬
2	S-1	体表面積1.25㎡未満:80mg 体表面積1.25~1.5㎡:100mg 体表面積1.5㎡以上:120mg	1日2回朝夕食後 28日間内服 14日間休薬	day1~28内服、 day29~42休薬
コメント	・アバスチンは、初回90分、2回目以降60分、30分と短縮し1コース2週間毎3回投与し2週間休薬			
	・S-1は、1日目夕食後より28日間内服し、14日間休薬する。			

投与日	薬剤名	ルート	時間
day1	① グラニセトロン1mgバッグ + デキサート ② アバスチン5mg/kg + 生食100mL(必ず生食) ③ 生食 50mL ④ゼローダ錠 夕食後より内服開始	div.or IVH div.or IVH フラッシュ po.	15分 90分
day15、29	① グラニセトロン1mgバッグ + デキサート ② アバスチン5mg/kg + 生食100mL(必ず生食) ③ 生食 50mL	div.or IVH div.or IVH フラッシュ	15分 90分
day1夕~29朝	S-1 内服		
day29夕~42朝	その後2週間休薬		