

癌化学療法名 大腸癌補助化学療法 5-FU+I-LV(RPMI法)療

実施部署	入院・外来	1クール日数	7day	承認済 2011.1.11
番号	抗がん剤名・略称	1日投与量	投与方法	投与日
1	I-LV:レボホリナート	250mg/m <sup>2</sup>	div.(点滴静注)	day1
2	5-FU	500mg/m <sup>2</sup>	I-LV開始1時間後に全開で点滴静注	day1
コメント	<ul style="list-style-type: none"> <li>・毎週1回投与、6週間連続2週休薬(1クール8週間)。3サイクル繰り返す。</li> <li>・末梢より点滴静注可能</li> <li>・レボホリナートは生食500mLに希釈し、2時間かけて点滴静注</li> <li>・5-FUは生食100mLに希釈し、全開(数分)で点滴静注</li> </ul>			

投与日	薬剤名	ルート	時間
day1	① グラニセトロン1mgバッグ + デキサート ② レボホリナート250mg/m <sup>2</sup> + 生食 500mL ③ 5-FU 500mg/m <sup>2</sup> + 生食 100mL (5-FUは、 <u>レボホリナート開始1時間後に全開</u> で点滴静注)	i.v. i.v. i.v.	30分 2時間 全開
day2	① 生食20mL	フラッシュ	