

癌化学療法名 大腸癌 XELIRI療法 (カペシタビン+イリノテカン)

実施部署	入院・外来	1クール日数	21day(3週間)	未承認
番号	抗がん剤名・略称	1日投与量	投与方法	投与日
1	イリノテカン:カンプト注	200mg/m ²	div.(点滴静注)	day1
2	カペシタビン:ゼロータ錠300mg	1600m ² /mg	1日2回朝夕食後 14日間内服 7日間休薬	day1夕食後～ day15朝食後 (14日間連日服用)
コメント	・XELIRI療法は、3週間の治療スケジュール			
	・催吐性リスクは中等度(プロイメド注は適宜使用)			
	・副作用)下痢(Grade3以上);15%、手足症候群(Grade3以上);7%・・・XELIRI+BV療法試験データより			
	・CPT-11; WBC3000/mm ² 未満、Plt10万未満は禁忌			

投与日	薬剤名	ルート	時間
day1	① グラニセロン1mgバッグ + デキサート6.6mg	div.	15分
	② カンプト200mg/m ² + 5%ブドウ糖 250mL	div.	90分
	③ 生食50mL	フラッシュ	
	④ ゼロータ錠 (夕食後より内服開始)	po.	
day2～15朝	① ゼロータ錠 朝夕食後より内服開始	po.	
day15夕～22朝	① ゼロータ錠 内服休み		