

化学療法名 オレンシア療法（関節リウマチ）

実施部署	外来・入院	1クール日数	維持投与間隔: 4週間	承認済 2011.4.12	
番号	薬剤名	1回投与量	投与方法	投与日	
1	アパタセプト : オレンシア	60kg未満	500mg	div.(点滴静注)	初回投与後、2週、4週に投与し、以後 4週間隔で投与
		60kg以上 100kg以下	750mg		
		100kgを超える	1g		
コメント	<ul style="list-style-type: none"> ・無菌パイロジェンフリーのインラインフィルター(12ミクロン以下)使用⇒当院はPVCフリー輸液セット ・前投薬は必須ではないが、他のバイオ製剤投与歴がある方には前投薬を行った方が望ましい。 (* 前投薬をした際は、オレンシア投与前に生食フラッシュを行う) ・本剤に添付されたシリコーン油を塗布していない専用ディスポシリンジ及び18~21Gの針を用いて調製する。 ・生理食塩液(または注射用水)で総液量約100mLになるよう希釈する。(1Vあたり10mLで溶解) ・全量30分かけて点滴静注する。 				

投与日	薬剤名	ルート	時間
day1	<p>(前投薬レスタミン錠・H₂ブロッカー・解熱鎮痛剤の内服は基本的に不要)</p> <p>① 水溶性プレドニン＋生食100mL</p> <p>② 生食50mL</p> <p>③ オレンシア点滴静注用＋生食100mL</p> <p>(オレンシアを調製する際は、添付された専用シリンジを使用)</p>	<p>div</p> <p>div</p> <p>div</p>	<p>30分</p> <p>全開でフラッシュ</p> <p>30分</p>