

化学療法名 ゴナックス皮下注用120mg /80mg療法(前立腺がん)

実施部署	外来・入院	1クール日数	4週間に1回	未承認
番号	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与日
1	デガレリクス :ゴナックス	120mg	皮下投与	初回 4週間に1回
2	デガレリクス :ゴナックス	80mg	皮下投与	2回目以降 4週間に1回
備考欄	・本剤は初回投与時は120mgバイアル2本、2回目以降の投与時は80mgバイアル1本を使用すること。			
	・本剤は注射用水で溶解する。溶解後1時間以内に使用すること。			
	・投与液濃度、投与量が有効性に影響するため、調製方法を遵守すること。(本剤は溶解しにくい ため、溶け残りがなく、溶液が透明な状態になるまで溶解し、規定する量を抜き取るよう注意)			
	・発汗、多汗、ほてりや発疹・湿疹などの皮膚障害や注射部位が硬くなったり痛みを感じるなどの 注射部位の異常がある。			
	・外来化学療法加算B			

投与日	薬剤名	ルート	時間
day1 (初回)	①ゴナックス皮下注用120mg 1瓶 + 注射用水3.0mL (それぞれ2瓶溶解) 初回投与: 1カ所あたり、本剤120mg/瓶に注射用水3.0mLを注入し、溶解後速やかに3.0mLを皮下投与する。1カ所あたり120mgずつ腹部2カ所に皮下投与。	皮下投与	約20分
day29~ (2回目以降)	①ゴナックス皮下注用80mg + 注射用水4.2mL 2回目以降投与: 1カ所あたり、本剤80mg/瓶に注射用水4.2mLを注入し、溶解後速やかに4.0mLを腹部に皮下投与する。	皮下投与	約15分