

癌化学療法名 精巣腫瘍 BEP療法

実施部署	入院・外来	1クール日数	21day	未承認
番号	抗がん剤名・略称	1日投与量	投与方法	投与日
1	ブレオ(BLM)	30mg/body	div.(点滴静注)	day1
2	ベプシド(VP-16)	1.2g/m ²	div.(点滴静注)	day1～5
3	シスプラチン(CDDP)	20mg/m ²	div.(点滴静注)	day1～5
コメント	BLMは累積投与量が多いほど肺毒性に注意。360mg/bodyまで投与可能。腎排泄型。 VP-16急速静注により不整脈の報告あるため、30分以上かけて投与			

投与日	薬剤名	ルート	時間
day1	①プロイメンド点滴静注用150mg+生食100mL	div	30分
day1	② 生食 50mL	div	
day1	③アロキシ静注0.75mg+デキサート注射6.6mg+1.65mg+生食100mL	div	30分
day1、8、15	④ ブレオ注30mg/body +生食100mL	div	2時間
day1～5	⑤ ベプシド注100mg/m² +生食500mL	div	30分
day1～5	⑥ アスパラカリウム注10mEq 1V+硫酸Mg補正液++メイロン静注1V+生食 1000mL	div	2時間
day1～5	⑦ シスプラチン注 +生食250mL	div	30分
day1～5	⑧ 20%マンニトール注射液300mL 0.5V	div	1時間
day1～5	⑨ アスパラカリウム注10mEq 1V+生食 1000mL	div	30分
day1～5	⑩ アスパラカリウム注10mEq 1V+生食 1000mL	div	2時間
day1～5	⑪ 生食 50mL	div	2時間
day2～5	① デキサート注射液6.6mg+1.66mg+生食100mL	div	30分