癌化学療法名 乳癌 Weeklyパクリタキセル・トラスツズマブ療法

| 実施部署 | 外来·入院 | 1クール日数 | 28day | | |
|------|---|----------------------|------------|--------------|--|
| 番号 | 抗がん剤名・略称 | 1日投与量 | 投与法 | 投与日 | |
| 1 | パクリタキセル: タキソール | 80mg/m² | div.(点滴静注) | day1,8,15 | |
| 2 | トラスツズマブ: ハーセプチン | 初回4mg/kg 2回目以降2mg/kg | div.(点滴静注) | day1,8,15,28 | |
| コメント | ・ハーセプチンは、初回投与 4mg/kg、2回目以降 2mg/kgを週1回投与する。 | | | | |
| | ・タキソール(パクリタキセル)は、80mg/㎡を週1回 3週間投与し、1週休薬する。PVCフリー輸液セットを使用。 | | | | |
| | ・タキソール(パクリタキセル)投与30分前までに レスタミン錠(10mg) 5錠内服 | | | | |

| 投与日 | 薬剤名 | ルート | 時間 |
|--------------|-----------------------------|-------|-----|
| day1,8,15,28 | ① ハーセプチン2mg/kg + 生食 250mL | div | 90分 |
| day1,8,15 | ② グラニセトロン1mgバッグ + デキサート | div | 30分 |
| (day28休薬) | (開始時、レスタミン錠10mg 5錠内服) | | |
| | ③ 生食20mL+ザンタック100mg | iv | |
| | ④ 外来; タキソール80mg/m + 生食250mL | div | 90分 |
| | 入院;パクリタキセル80mg/m + 生食250mL | div | 90分 |
| | ⑤生食20mL | フラッシュ | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |