

癌化学療法名 大腸癌 SIRB療法 (Bmab+イリノテカン+TS-1))

実施部署	入院・外来	1クール日数	21day(3週間)	未承認
番号	抗がん剤名・略称	1日投与量	投与方法	投与日
1	ペバシズマブ:アバスチン注	7.5mg/kg	div.(点滴静注)	day1
2	イリノテカン:カンプト注	150mg/m <sup>2</sup>	div.(点滴静注)	day1
3	TS-1:ティーエスワン配合OD錠	80~120mg/day	1日2回朝夕食後 14日間内服 7日間休薬	day1夕食後~ day15朝食後 (14日間連日服用,7 日間休薬)
コメント	・催吐性リスクは中等度で、制吐薬は長時間型のアロキシ注を推奨(プロイメンド注は適宜使用)			
	・有害事象(Grade3以上);下痢 8%、食欲不振12%、好中球減少 26%、			
	・CPT-11; WBC3000/mm <sup>2</sup> 未満、Plt10万未満は禁忌			

投与日	薬剤名	ルート	時間
day1	① アバスチン注7.5mg/kg + 生食100mL ② アロキシ注0.75mg + デキサート9.9mg + 生食100mL ③ カンプト150mg/m <sup>2</sup> + 生食 250mL ④ 生食50mL  ⑤ ティーエスワン配合OD錠 (夕食後より内服開始)	div. div. div. フラッシュ  po.	90分 30分 90分
day2~15朝	① ティーエスワン配合OD錠 朝夕食後内服	po.	
day15夕~21朝	① ティーエスワン配合OD錠 内服休み		