

癌化学療法名 膵癌 mFOLFIRINOX療法

実施部署	入院・外来	1クール日数	14day	承認済
番号	抗がん剤名・略称	1日投与量	投与方法	投与日
1	CPT-11: カンプト	150mg/m ²	div.(点滴静注)	day1
2	I-OHP: エルプラット	85mg/m ²	div.(点滴静注)	day1
3	LV: レボホリナート	200mg/m ²	div.(点滴静注)	day1
4	フルオロウラシル注	2400mg/m ²	持続静注	day1
フルオロウラシル注(ポーラス)投与はありません。				
減量基準; 好中球<500、血小板<5万、消化器症状≥Grade3、又は神経毒性Grade2以上				
UGT1A11*6、1*28); CPT-11投与量、ヘテロは20%減量、ホモ・ダブルヘテロは50%減量				
5-FU; Cr3以下であれば減量無し、T-BIL5以下であれば100%可能				
オキサリプラチン; Ccr>20であれば減量無し、肝障害での減量基準無し				
イリノテカン; 腎障害での減量基準無し、BLI1.5~3×ULNの場合20~25%減量				
投与日	薬剤名		ルート	時間
day1	① イメンドCap 125mg(アロキシ注投与前に内服)		内服	
	② アロキシ注75mg + デキサート注6.6mg + 生食100mL		div.	30分
	③ エルプラット85mg/m² + 5%ブドウ糖250mL		div.	2時間
	④ レボホリナート200mg/m² + 5%ブドウ糖250mL (④と⑤は同時投与)		div.	2時間
	⑤ カンプト150mg/m² + 5%ブドウ糖250mL (④と⑤は同時投与、但しレボホリ開始30分後から開始)		div.	90分
	⑥ フルオロウラシル 2400mg/m² + 生食(携帯ポンプ、全量100ml)		持続静注	46時間
day2.3	① イメンドCap 80mg		内服	
day3	① 生食シリンジ 5mL			
	② ヘパリンNaロック用100単位 5mL			