

癌化学療法名 胃癌 肺癌 シスプラチン・TS-1療法 5週毎

実施部署	外来・入院	1クール日数	35day	承認済 2008.3.26
番号	抗がん剤名・略称	1日投与量	投与方法	投与日
1	シスプラチン:ブリプラチン	60mg/m ²	div.(点滴静注)	day8
2	TS-1:ティーエスワンカプセル	体表面積1.25m ² 未満: テカフル相当量80mg	内服	day1~21 1日2回
		体表面積1.25m ² 以上 ~1.5m ² 未満: テカフル相当量100mg		
		体表面積1.5m ² 以上: テカフル相当量120mg		day22~35 休薬
コメント	<p>・TS-1は 3週間服用、2週間休薬</p> <p>・ブリプラチンは遮光</p> <p>・腎毒性軽減のため水分負荷が必要</p> <p>・NCCNガイドライン2009をもとに、ブリプラチン60mg/m²は高度催吐性リスクに相当するため、イメンド(成分名:アプレピタント)125mg+グラニセトロン(5-HT3受容体拮抗薬)+デキサート注9.9mg(デキサート注)3剤併用が推奨される。</p>			

投与日	薬剤名	ルート	時間
day1~21	ティーエスワンカプセル()mg/日	内服	朝夕食後
day8	① ソルアセトF 500mL	div	120分
	② 5%ブドウ糖 500mL	div	120分
	③ 5%ブドウ糖 500mL	div	150分
	④ ソルアセトF 500mL	div	150分
	⑤ グラニセトロン1mgバッグ + デキサート	div(側管)	15分
	⑥ ブリプラチン60mg/m ² + 生食 500mL	div(側管)	120分
	⑦ ラシックス注20mg 1A	iv(側管)	
	(⑦ 又はマンニトール注20% 200mL~300mL)	div(側管)	60分
	⑧ デキサート + 生食 100mL (20時から)	div(側管)	30分
	⑨ ソルデム3A 500mL	div	60mL/h
	⑩ ソルデム3A 500mL	div	60mL/h

