

癌化学療法名

胃癌 アブラキサン療法

(Weekly nab-パクリタキセル)

|  |   |                         |            |               |
|--|---|-------------------------|------------|---------------|
| 実施部署   | 外来・入院   | 1クール日数                  | 21day      | 承認 H25.5.14   |
| 番号   | 抗がん剤名・略称  | 1日投与量                   | 投与方法       | 投与日           |
| 1  | パクリタキセル:アブラキサン  | A法 260mg/m <sup>2</sup> | div.(点滴静注) | day1(20日間は休薬) |
|  |   | B法 100mg/m <sup>2</sup> | div.(点滴静注) | day1,8,15     |
| * 原則、胃癌はA法(1日1回260mg/m <sup>2</sup> 20日休薬)だが、有害事象を考慮してB法で行うこともある |   |                         |            |               |
| コメント   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・アブラキサンは、パクリタキセルのアルブミン結合型</li> <li>・A法/B法減量)好中球&lt;500/mm<sup>3</sup>(1000でも減量を考慮)、血小板&lt;5万/mm<sup>3</sup>、末梢神経障害≥Grade3(G2以下でも減量を考慮する)皮膚障害≥Grade2、粘膜炎又は下痢≥Grade3、非血液学的毒性≥Grade3</li> <li>・血液製剤なので、管理伝票が必要</li> <li>・アブラキサンの点滴時間は、30分</li> <li>・過敏反応予防としての前投薬は不要</li> <li>・PVCフリー輸液セットは不要 (PVC製輸液セット使用可)</li> <li>・インラインフィルターは使用しない</li> <li>・調製後の懸濁液は保存剤が含有していないため速やかに使用すること。やむをえず保存を必要とする場合は、冷蔵庫(2~8℃)に遮光保存して8時間以内に使用すること</li> <li>・生理食塩液で調製し懸濁液とし、希釈はしない(アブラキサン粒子が崩壊するため)</li> </ul> |                         |            |               |
| 投与日  | 薬剤名   |                         | ルート        | 時間            |
| day1   | ① 生食100mL + デキサート6.6mg  |                         | div        | 30分           |
|  | ② <b>アブラキサン80mg/m<sup>2</sup></b> + 生食50mL(3バイアル以上の時は100mL使用)   |                         | div        | 30分           |
|  | (1バイアル当たり生理食塩液20mLで溶解し、空お点滴バッグに注入)  |                         |            |               |
|  | ④生食20mL   |                         | フラッシュ      |               |

