

癌化学療法名 尿路上皮癌 GC(ゲムシタビン+シスプラチン)療法

(膀胱癌、腎盂癌、尿管腫瘍)

実施部署	入院	1クール日数	28day	承認済 2010.1.19
番号	抗がん剤名・略称	1日投与量	投与方法	投与日
1	ゲムシタビン:ジェムザール	1,000mg/m ²	div.(点滴静注)	day1,(8,15)
2	シスプラチン:ブリプラチン	70mg/m ²	div.(点滴静注)	day2
コメント	<ul style="list-style-type: none"> ・ジェムザールは、週1回投与を30分間点滴静注。 ・ブリプラチンは遮光 ・腎毒性軽減のため水分負荷が必要、1日3000mL以上の尿量確保を目安に尿量測定実施 			

投与日	薬剤名	ルート	時間
day1,8,15	① グラニセトロン点滴静注液1mgバッグ+デキサート8mg	div	30分
	② ジェムザール1,000mg/m ² + 生食 100mL (輸液ポンプ使用)	div	30分
day2	① デキサート8mg + 生食 100mL	div	30分
	② ブリプラチン 70mg/m ² (シリンジポンプ使用)	div	2時間以上
	③ ラシックス注20mg	側管	ゆっくりと