

癌化学療法名 肺癌(非小細胞) シスプラチン・ペムドレキシセド療法

実施部署	入院	1クール日数	21day	未承認
番号	抗がん剤名・略称	1日投与量	投与方法	投与日
1	シスプラチン(CDDP): プリプラチン	60mg/m ²	div.(点滴静注)	day1
2	ペムドレキシセド: アリムタ	500mg/m ²	div.(点滴静注)	day1
コメント	<ul style="list-style-type: none"> ・腎毒性軽減のため水分負荷が必要 ・プリプラチンは アリムタ投与30分後の投与 ・プリプラチンは高度催吐リスクのため イメンド内服とアロキシ及びデキサートを使用 ・治療1週間前より、副作用予防としてビタミンB12 1g(メチコバール注500μg 2管)を筋注(9週毎) ・治療1週間前より、副作用予防として葉酸0.5mg(パンビタン末1g)を経口内服(連日)、アリムタ最終投与から22日目まで可能な限り服用する。・・・ 光に不安定のため遮光必要 ・出来れば、皮疹予防のためにデキサメタゾン8mgを投与前日、当日、翌日に経口又は注射にて投与するのが望ましい ・非扁平上皮肺癌に有効 			

投与日	薬剤名	ルート	時間
アリムタ投与 7日前～	① メチコバール注 500μg 2A	筋注	9週毎
	② 調剤用パンビタン末(葉酸0.5mg/g) 1g	経口	連日
day1	① ソルデム3A 500mL	div	2時間
	② ソルデムD 500mL	div	2時間
	③ アロキシ注0.75mg + デキサート注 + 生食100mL	div	15分
	④ アリムタ注射用500mg/m² + 生食100mL	div	10分
	⑤ ソルデム3A 200mL	div	30分
	⑥ プリプラチン75mg/m² + 生食500mL	div	2時間
	⑦ ラシックス注	側管	
	⑧ ソルデム3A 500mL	div	2時間
	⑨ ソルデムF 500mL	div	2時間