

## 癌化学療法名 肺癌(非小細胞) ペメドレキセド療法

実施部署	外来・入院	1クール日数	21day	承認済 2010.1.19
番号	抗がん剤名・略称	1日投与量	投与方法	投与日
1	ペメドレキセド:アリムタ	500mg/m <sup>2</sup>	div.(点滴静注)	day1
コメント	<ul style="list-style-type: none"> <li>・少なくとも治療1週間前より、副作用予防としてビタミンB12 1mg(メチコバル注500μg 2管)を筋注(9週毎)</li> <li>・少なくとも治療1週間前より、副作用予防として葉酸0.5mg(パンビタン末1g)を経口内服(連日)、アリムタ最終投与から22日目まで可能な限り服用する。・・・光に不安定のため遮光必要</li> <li>・出来れば、皮疹予防のためにデキサメタゾン8mgを投与前日、当日、翌日に経口又は注射にて投与するのが望ましい</li> <li>・非扁平上皮肺癌に有効。</li> </ul>			
投与日	薬剤名		ルート	時間
アリムタ投与 7日前～	① メチコバル注 500μg 2A		筋注	9週毎
	② 調剤用パンビタン末(葉酸0.5mg/g) 1g		経口	連日
day1	① <b>グラニセロン点滴静注液1mgバッグ</b> + デキサート8mg		div	30分
	② <b>アリムタ注射用500mg/m<sup>2</sup></b> + 生食100mL		div	10分