

癌化学療法名 ANCA関連血管炎 シクロホスファミドパルス療法

実施部署	外来・入院	1クール日数	4週間	未承認
番号	抗がん剤名・略称	1日投与量	投与方法	投与日
1	シクロホスファミド: エンドキサン	500mg/m ²	div.(点滴静注)	day1
コメント	<ul style="list-style-type: none"> ・末期腎不全進行する可能性の高い増殖性変化の高いWHO分類Ⅲ/Ⅳ型でステロイド抵抗性を示すループス腎炎患者(但し、適応外使用) ・全身性血管炎(顕微鏡的多発血管炎, ヴェゲナ肉芽腫症, 結節性多発動脈炎, Churg-Strauss症候群, 大動脈炎症候群等) 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・白血球数のモニタリングをして投与量を調節する。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・出血性膀胱炎予防のために、投与当日は尿量が3L以上になるよう飲水励行すること。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・出血性膀胱炎予防に、低用量CPAの場合はメスナやハイドレーションは不要だが、血尿や排尿痛が生じた場合は使用を検討する。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・エンドキサン注は揮発性が高いため、閉鎖式調製器具を用いることが望ましい。 			
<ul style="list-style-type: none"> ・エンドキサン注の血管外漏出リスクは壊死性抗がん剤であり、漏れた場合は、冷 				

投与日	薬剤名	ルート	時間
day1	① グラニセトロン1mgバッグ + デキサート注	div	15分
	② エンドキサン注500mg/m² + 生食100mL	div	60分
	④生食50mL	フラッシュ	