

癌化学療法名 胆道癌 GC(ゲムシタビン+シスプラチン)(2週投与1週休薬)療法

実施部署	入院	1クール日数	21day	未承認
番号	抗がん剤名・略称	1日投与量	投与方法	投与日
1	ゲムシタビン:ゲムシタビン	1,000mg/m ²	div.(点滴静注)	day1,8
2	シスプラチン:ブリプラチン	25mg/m ²	div.(点滴静注)	day1,8
コメント	<ul style="list-style-type: none"> ・ゲムシタビンは、週1回投与を30分間点滴静注。 ・ブリプラチンは遮光 ・CDDPによる腎毒性軽減のために硫酸MgをCDDP前に投与、尿量測定実施 ・3週目は休薬 			

投与日	薬剤名	ルート	時間
day1,8	① 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL)+ 生食 500mL	div	30分
	② アロキシ静注0.75mg+デキサート6.6mg + 生食 100mL	div	30分
	③ ブリプラチン 25mg/m² + 生食500mL (輸液ポンプ使用)	div	2時間
	④ ゲムシタビン1,000mg/m² + 生食 100mL (輸液ポンプ使用)	div	30分
	⑤ ラシックス注20mg	div	ゆっくりと
	⑥ 生食50mL		フラッシュ