

癌化学療法名 胆道癌 デュルバルマブ+GC(イミフィンジ+ゲムシタビン+シスプラチン)療法

実施部署	入院	1クール日数	21day(28day)	未承認
番号	抗がん剤名・略称	1日投与量	投与方法	投与日
1	デュルバルマブ: イミフィンジ点滴静注	1500mg/body	内服	day1
2	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	div.(点滴静注)	day1
3	ゲムシタビン	1,000mg/m <sup>2</sup>	div.(点滴静注)	day1,8
コメント	<ul style="list-style-type: none"> <li>・デュルバルマブはヒト型抗PD-1L1モノクローナル抗体、irAE観察必要</li> <li>・デュルバルマブは1回1500mg(固定用量)で、GC併用は3週間間隔。但し体重30kg未満は20mg/kg。最大8コースまで投与後、デュルバルマブ1回1500mgを単独で4週間間隔でPDまで投与</li> <li>・最低1コース目はGC併用、副作用などでCDDP投与困難な場合はデュルバルマブ単独で4週間間隔でPDまで継続可能</li> </ul>			

投与日	薬剤名	ルート	時間
day1	① 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL)+ 生食 500mL	div	90分
	② アロカリス注+パロノセトロン静注0.75mgバッグ+デキササート6.6mg	div	30分
	③ <b>イミフィンジ点滴静注 1500mg</b> + 生食250mL	div	1時間
	④ <b>シスプラチン 25mg/m<sup>2</sup></b> + 生食250mL	div	1時間
	⑤ <b>ゲムシタビン1,000mg/m<sup>2</sup></b> + 生食 100mL	div	30分
	⑥ ラシックス注20mg (前後生食20mLでフラッシュ)	側管	ゆっくりと
	⑦ ソルアセトF 500mL		90分
day8	① グラニセトロン+デキササート6.6mg	div	15分
	② <b>シスプラチン 25mg/m<sup>2</sup></b> + 生食250mL	div	30分
	③ 生食50mL	div	フラッシュ