

癌化学療法名 大腸癌 46時間持続 FOLFIRI療法

| | | | | |
|------|-------------|------------------------|------------|---------------|
| 実施部署 | 外来・入院 | 1クール日数 | 14day | 承認済 2008.3.26 |
| 番号 | 抗がん剤名・略称 | 1日投与量 | 投与方法 | 投与日 |
| 1 | CPT-11:カンプト | 150mg/m ² | div.(点滴静注) | day1 |
| 2 | LV:レボホリナート | 200mg/m ² | div.(点滴静注) | day1 |
| 3 | 5-FU | 400mg/m ² | div.(点滴静注) | day1 |
| 4 | 5-FU | 2,400mg/m ² | 持続静注 | day1,2 |
| コメント | | | | |

| 投与日 | 薬剤名 | ルート | 時間 |
|--------|---|-------|------|
| day1 | ① グラニセロンバッグ1mg + デキサート8mg | IVH | 30分 |
| | ② レボホリナート200mg/m ² + 5%ブドウ糖250mL (②と③は同時投与) | div. | 2時間 |
| | ③ カンプト150mg/m ² + 5%ブドウ糖250mL (②と③は同時投与) | div. | 2時間 |
| | ④ 5-FU400mg/m ² + 5%ブドウ糖100mL (輸液ポンプはずして全開で) | 急速静注 | |
| day1~2 | ⑤ 5-FU2,400mg/m ² + 5%ブドウ糖(全量230mLになるよう調節) (全量230mLにしてバクスターインフューザー使用) | 持続静注 | 46時間 |
| day3 | ① ヘパリンNaロック用100単位 5mL | フラッシュ | |