

癌化学療法名 大腸癌 ベパシズマブ(5)・FOLFOX4療法

実施部署	入院	1クール日数	14day	承認済 2008.3.26
番号	抗がん剤名・略称	1日投与量	投与方法	投与日
1	ベパシズマブ:アバステン	5mg/kg	div.(点滴静注)	day1
2	オキサリプラチン:エルプラット	85mg/m <sup>2</sup>	div.(点滴静注)	day1
3	LV:レボホリナート	100mg/m <sup>2</sup>	div.(点滴静注)	day1,2
4	5-FU	400mg/m <sup>2</sup>	div.(点滴静注)	day1,2
5	5-FU	600mg/m <sup>2</sup>	持続静注	day1,2
コメント	・アバステンは、初回90分、2回目以降60分、30分と短縮可。			

投与日	薬剤名	ルート	時間
day1	① アバステン5mg/kg + 生食100mL ② グラニセトロン1mgバッグ + デキサート (5%ブドウ糖でフラッシング) ③ レボホリナート100mg/m <sup>2</sup> + 5%ブドウ糖250mL (③と④は同時投与) ④ エルプラット85mg/m <sup>2</sup> + 5%ブドウ糖250mL (③と④は同時投与) ⑤ 5-FU400mg/m <sup>2</sup> + 5%ブドウ糖100mL (輸液ポンプはずして全開で) ⑥ 5-FU600mg/m <sup>2</sup> + 5%ブドウ糖500mL	IVH div. div. div. 急速静注 持続静注	90分 30分 2時間 2時間 22時間
day2	① グラニセトロン1mgバッグ + デキサート ② レボホリナート100mg/m <sup>2</sup> + 5%ブドウ糖250mL ④ 5-FU400mg/m <sup>2</sup> + 5%ブドウ糖100mL (輸液ポンプはずして全開で) ⑤ 5-FU600mg/m <sup>2</sup> + 5%ブドウ糖500mL	IVH div. 急速静注 持続静注	30分 2時間 22時間
day3	① 生食20mL ② ヘパリンNaロック用100単位 5mL	フラッシュ	