

癌化学療法名 大腸癌 ベパシズマブ(5)・FOLFIRI法(100mL用)

実施部署	入院・外来	1クール日数	14day	承認済 2008.3.26
番号	抗がん剤名・略称	1日投与量	投与方法	投与日
1	ベパシズマブ: アバスチン	5mg/kg	div.(点滴静注)	day1
2	CPT-11: カンプト	150mg/m <sup>2</sup>	div.(点滴静注)	day1
3	LV: レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	div.(点滴静注)	day1
4	5-FU	400mg/m <sup>2</sup>	div.(点滴静注)	day1
5	5-FU	2,400mg/m <sup>2</sup>	持続静注	day1,2
コメント	・アバスチンは、初回90分、2回目以降60分、30分と短縮可。			

投与日	薬剤名	ルート	時間
day1	① <b>アバスチン5mg/kg</b> + 生食100mL	IVH	90分
	② <b>グラニセトロン1mgバッグ</b> + デキサート (5%ブドウ糖でフラッシング)	div.	30分
	③ <b>レボホリナート200mg/m<sup>2</sup></b> + 5%ブドウ糖250mL (③と④は同時投与)	div.	2時間
	④ <b>カンプト150mg/m<sup>2</sup></b> + 5%ブドウ糖250mL (③と④は同時投与)	div.	2時間
	⑤ <b>5-FU400mg/m<sup>2</sup></b> + 5%ブドウ糖100mL (輸液ポンプはずして全開で)	急速静注	
day1~2	⑥ <b>5-FU2,400mg/m<sup>2</sup></b> + 5%ブドウ糖100mL (全量100mLにして携帯持続ポンプを使用)	持続静注	46時間
day3	① ヘパリンNaロック用100単位 5mL		