

癌化学療法名 大腸癌 FOLFIRI療法

実施部署	入院	1クール日数	14day	承認済 2008.3.26
番号	抗がん剤名・略称	1日投与量	投与方法	投与日
1	CPT-11:カンプト	150mg/m ²	div.(点滴静注)	day1
2	LV:レボホリナート	100mg/m ²	div.(点滴静注)	day1,2
3	5-FU	400mg/m ²	div.(点滴静注)	day1,2
4	5-FU	600mg/m ²	持続静注	day1,2
コメント				

投与日	薬剤名	ルート	時間
day1	① グラニセロン1mgバッグ + デキサート ② レボホリナート100mg/m ² + 5%ブドウ糖 250mL (②と③は同時投与) ③ カンプト150mg/m ² + 5%ブドウ糖 250mL (②と③は同時投与) ④ 5-FU400mg/m ² + 5%ブドウ糖 100mL (輸液ポンプはずして全開で) ⑤ 5-FU600mg/m ² + 5%ブドウ糖 500mL	IVH div. div. 急速静注 持続静注	30分 2時間 2時間 約5分 22時間
day2	① グラニセロン1mgバッグ + デキサート ② レボホリナート100mg/m ² + 5%ブドウ糖 250mL ④ 5-FU400mg/m ² + 5%ブドウ糖 100mL (輸液ポンプはずして全開で) ⑤ 5-FU600mg/m ² + 5%ブドウ糖 500mL	IVH div. 急速静注 持続静注	30分 2時間 約5分 22時間
day3	① 生食20mL ② ヘパリンNaロック用100単位 5mL	フラッシュ	