癌化学療法名 大腸癌 ベバシズマブ(2週間毎)+ロンサーフ療法

| 実施部署 | 入院·外来 | 1ク一ル日数 | 28day | 未承認 | |
|------|---|-----------|-----------------|--|--|
| 番号 | 抗がん剤名・略称 | 1日投与量 | 投与法 | 投与日 | |
| 1 | ベバシズマブ:ベバシズマブBS点滴静注 | 5mg/kg | div.(点滴静注)又はIVH | day1,15 | |
| 2 | ロンサーフ配合錠 | 70mg/m2/日 | 朝夕食後 内服 | 5日間内服、2日間休 薬これを2回繰り返 し、その後14日間休 薬 | |
| | ロンサーフは、5日間内服、2日間休薬これを2回繰り返し、その後14日間休薬 | | | | |
| | ロンサーフ1コース目は、開始前、8日目、15日目、21日目に検査と症状観察を実施822日目前後に骨髄抑制に起因する感染症に注意 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 投与日 | 薬剤名 | ルート | 時間 |
|-------|---|------------|------|
| day1 | ① 生食 50mL | div.or IVH | 15分 |
| | ② べバシズマブBS5mg/kg + 生食100mL(必ず生食) | div.or IVH | 90分 |
| | ③ 生食 50mL | フラッシュ | |
| | ④ ロンサーフ配合錠 夕食後より内服開始 | po. | 朝夕食後 |
| | (5日間内服、2日間休薬これを2回繰り返し、その後14日間休薬) | | |
| day15 | ① 生食 50mL | div.or IVH | 15分 |
| | ② べバシズマブBS5mg/kg + 生食100mL(必ず生食) | div.or IVH | 90分 |
| | ③ 生食 50mL | フラッシュ | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |