

癌化学療法名 大腸癌 mFOLFOX6療法

実施部署	外来・入院	1クール日数	14day	承認済 2008.3.26
番号	抗がん剤名・略称	1日投与量	投与方法	投与日
1	オキサリプラチン:エルプラット	85mg/m ²	div.(点滴静注)	day1
2	LV:レボホリナート	200mg/m ²	div.(点滴静注)	day1
3	5-FU	400mg/m ²	div.(点滴静注)	day1
4	5-FU	2,400mg/m ²	持続静注	day1,2
コメント				

投与日	薬剤名	ルート	時間
day1	① グラニセロンバッグ1mg + デキサート8mg (中心静脈注射・精密持続 200mL/h)	IVH	30分
	② レボホリナート200mg/m ² + 5%ブドウ糖250mL (②と③は同時投与) (中心静脈注射・精密持続 125mL/h)	div.	2時間
	③ エルプラット85mg/m ² + 5%ブドウ糖250mL (②と③は同時投与) (中心静脈注射・精密持続 125mL/h)	div.	2時間
	④ 5-FU400mg/m ² + 5%ブドウ糖100mL (輸液ポンプはずして全開で) (中心静脈注射・回路より)	急速静注	約5分
day1~2	⑤ 5-FU2,400mg/m ² + 5%ブドウ糖(全量230mLになるよう調節) (全量230mLにしてバクスターインフューザー使用、中心静脈注射・回路より 5mL/h)	持続静注	46時間
day3	① ヘパリンNaロック用100単位 5mL	フラッシュ	