

癌化学療法名 腎癌 ペンブロリズマブ(キイトルーダ)+アキシチニブ(インライタ錠)併用療法

実施部署	外来・入院	1クール日数	21day	未承認
番号	抗がん剤名・略称	1日投与量	投与方法	投与日
1	キイトルーダ点滴静注	200mg/body	div.(点滴静注)	day1
2	インライタ錠	1回5mg 1日2回	内服	連日
コメント	・根治切除不能又は転移性腎細胞癌における1次治療から使用可能			
	・インラインフィルター0.2又は5 μ mを使用する			
	・ペンブロリズマブ投与時間は30分間かけて点滴静注			
	・ヒトPD-1に対するヒト化モノクローナル抗体キイトルーダ点滴静注は、骨髄抑制及び免疫関連有害反応に対するモニタリングにあたり、オプジーボと同じ検査セットを使用する			
	・VEGFR阻害薬インライタ錠は、高血圧・血栓塞栓症・出血・消化管穿孔など副作用モニタリングを行う			

投与日	薬剤名	ルート	時間
day1	① 生食 50mL	div	ライン確保
	② キイトルーダ 200mg/body + 生食 100mL (200mL/h)	div	30分
	③ 生食50mL	フラッシュ	直前と同じ速度で
day1～	インライタ錠 1回5mg 1日2回	内服	連日