

癌化学療法名 膀胱癌・尿管癌・腎盂癌 GP療法(ゲムシタビン+パクリタキセル)

(1週投与2週休薬)

実施部署	入院	1クール日数	21day	未承認
番号	抗がん剤名・略称	1日投与量	投与方法	投与日
1	ゲムシタビン	1000mg/m ²	div.(点滴静注)	day1
2	パクリタキセル	200mg/m ²	div.(点滴静注)	day1
コメント	<p>・前投薬として、パクリタキセル投与30分前に レスタミン錠10mg 5錠内服、デカドロン注、ファモチジン注を投与。フィルター付きケモセーフ。</p> <p>・生食1000mL+アスパラギン酸カリウムの輸液セットにロック付き延長チューブと三方活栓をつける。ファモチジン注は三方活栓から静注</p> <p>・無水エタノールを含有するため、アルコールアレルギーの人には禁忌。</p>			

投与日	薬剤名	ルート	時間
day1	① 生食 1000mL + アスパラギン酸カリウム (10mEq)1A	10:00	div(側下) 8時間
	② 生食 1000mL + アスパラギン酸カリウム (10mEq)1A	18:00	div(側下) 8時間
	③ 生食 1000mL + アスパラギン酸カリウム (10mEq)1A	2:00	div(側下) 8時間
	④ グラニセトロン1mg/バッグ + デキサート	10:00~10:15	div(メイン) 15分
	⑤ ファモチジン注20mL1A (ファモチジン注と同時にレスタミン錠10mg5錠を内服)		iv
	⑥ ゲムシタビン1000mg/m² + 生食250mL	10:15~10:45	div(側上) 30分
	⑦ パクリタキセル200mg/m² + 5%ブドウ糖500mL 166mL/h	10:45~13:45	div(側上) 3時間
	⑧ 生食 50mL	300mL/h	div(メイン) 15分