

癌化学療法名 肺癌 アテゾリズマブ+カルボプラチン+エトプシド療法

実施部署	外来・入院	1クール日数	21day	未承認
番号	抗がん剤名・略称	1日投与量	投与法	投与日
1	テセントリク点滴静注	1200mg/body	div.(点滴静注)	day1
2	カルボプラチン点滴静注	AUC 5	div.(点滴静注)	day1
3	エトプシド点滴静注	100mg/m <sup>2</sup>	div.(点滴静注)	day1
コメント	・進展型小細胞肺癌に対する一次治療として抗PD-L1抗体薬			
	・アテゾリズマブ+カルボプラチン+エトプシドを4サイクル、維持療法としてアテゾリズマブ単独療			
	・インラインフィルター0.2又は0.22 μmを使用する			
	・投与時間は初回は60分かけて投与、忍容性あれば2回目以降30分			
	・骨髄抑制及び免疫関連有害反応に対するモニタリングにあたり、オプジーボ・キイトルーダ検査セットとして設定する			
	・入院の場合は、出来高算定可能			
・第3相試験IMpower133試験				

投与日	薬剤名	ルート	時間
day1	① プロイメンド注+生食100mL	div.	30分
	② アロキシ注75mg + デキサート注6.6mg+生食100mL	div.	30分
	③ <b>テセントリク 1200mg/body</b> + 生食 100mL	div	60分以上
	④ 生食50mL	フラッシュ	
	⑤ カルボプラチン注AUC5 + 生食250mL	div.	1時間
	⑥ <b>エトプシド注 100mg/m<sup>2</sup></b> + 生食250ml	div.	1時間
	⑦ 生食50mL	フラッシュ	
day2~3	① 生食 100mL+デキサート注6.6mg	div	30分
	⑥ <b>エトプシド注 100mg/m<sup>2</sup></b> + 生食250ml	div	1時間
	③ 生食50mL	フラッシュ	直前と同じ速度で